


Aborto en Argentina

Mitos versus estadísticas oficiales

María Elena Critto
Socióloga



Mito 1: La muerte por aborto es un prioridad de salud pública

Mito 1: La muerte por aborto es un prioridad de salud pública

- El aborto representa el 0,2% de las defunciones femeninas en edad fértil, ocupando el puesto 58 en el ranking de causas, y el 72 del total de todas las edades.
- En 2018 se registraron 19 muertes maternas debidas a “aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto” que son el 7% de las 257 defunciones totales.
- Tasa por aborto en general ha disminuido en 62% (5 c/100.000 NV) y es de las más bajas del mundo.

Mito 2: Hay un gran número de hospitalizaciones por abortos clandestinos

Los egresos hospitalarios por todo tipo de abortos son el 10% del total de hospitalizaciones por maternidad, y vienen disminuyendo (-43%).


Mito 3: La legalización del aborto permite reducir la mortalidad materna.

Estudios internacionales confirman que la mortalidad materna disminuye trabajando en educación, acceso a la salud calificada, mejoras en las condiciones de vida e información para el control de la fertilidad.

La legalización del aborto no tiene efecto causal.

El aborto representa el 0,2% de las defunciones femeninas en edad fértil, ocupando el puesto 58 en el ranking de causas.

Defunciones de mujeres en edad fértil (15 a 44 años) causas de muerte desglosadas, en números absolutos - Argentina 2018



Argentina tiene registros de muerte materna confiables, y son calificados como de buena calidad por la OMS y otros desde 1990

Appendix 2. Sixty-three countries with civil registration data characterized as complete, with good attribution of cause of death^a

Argentina	Greece	Portugal
Australia	Guatemala	Republic of Korea
Austria	Hungary	Republic of Moldova
Bahamas	Iceland	Romania
Barbados	Ireland	Russian Federation
Belarus	Israel	Serbia
Belgium	Italy	Singapore
Belize	Japan	Slovakia
Bulgaria	Kazakhstan	Slovenia
Canada	Kuwait	Spain
Chile	Latvia	Suriname
Colombia	Lithuania	Sweden
Costa Rica	Luxembourg	Switzerland
Croatia	Malta	The former Yugoslav Republic of Macedonia
Cuba	Mauritius	Trinidad and Tobago
Czech Republic	Mexico	Ukraine
Denmark	Netherlands	United Kingdom
Estonia	New Zealand	United States of America
Finland	Norway	Uruguay
France	Panama	Uzbekistan
Germany	Poland	Venezuela (Bolivarian Republic of)

^a For the Bahamas, Belgium, Iceland and Malta (0.1% of global births), the statistical model was used because the paucity of the event of maternal mortality gave implausible trends.



El registro de muerte materna en Argentina es calificado como completo, de buena calidad y usabilidad por la **OMS, UNICEF, UNFPA y Banco Mundial**

CIE garantiza confidencialidad medico-paciente ante un aborto clandestino con códigos:


- O05 (otro aborto)
- O06 (aborto no especificado)
- O07 (intento fallido de aborto)

Fuente: *1) Trends in Maternal Mortality: [1990 to 2008](#) Estimates developed by WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank (P35)

*2) Trends in Maternal Mortality: [1990 to 2015](#) Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and the United Nations Population Division. Geneve: WHO, 2015. P. 45-46


De las 257 muertes maternas del 2018, 19 se deben a “aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto” -> 7% de las 257

Mortalidad materna proporcional, en porcentajes según causas de defunción - Argentina 2018



La tasa de mortalidad por aborto en general ha disminuido en 62% -> hoy sin aborto legalizado es una de las tasas más bajas del mundo (RMM 5 c/100.000 NV)

Y tasa por aborto “no especificado, otro aborto, intento fallido” = RMM 2 c/100.000 NV



Fuente: Elaboración Propia con datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación Argentina - DEIS

Mito 2: Hay un gran número de hospitalizaciones por abortos clandestinos

Mito 1: La muerte por aborto es un prioridad de salud pública

El aborto representa el 0,2% de las defunciones femeninas en edad fértil, ocupando el puesto 58 en el ranking de causas.

En 2018 se registraron 19 muertes maternas debidas a “aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto” que son el 7% de las 257 defunciones totales.

Tasa por aborto en general ha disminuido en 62% (5 c/100.000 NV) y es de las más bajas del mundo.

Mito 2: Hay un gran número de hospitalizaciones por abortos clandestinos

- Los egresos hospitalarios incluyen todo tipo de abortos, son el 10% del total de hospitalizaciones por maternidad, y vienen disminuyendo (-43%).


Mito 3: La legalización del aborto permite reducir la mortalidad materna.

Estudios internacionales confirman que la mortalidad materna disminuye trabajando en educación, acceso a la salud calificada, mejoras en las condiciones de vida e información para el control de la fertilidad.

La legalización del aborto no tiene efecto causal.

Los egresos hospitalarios por aborto incluyen todo tipo de abortos, son el 10% de las hospitalizaciones por maternidad, y han disminuido en un 43% del 2005 - 2016

Hospitalizaciones sector oficial maternidad – Argentina – 2005-2016



Mito 3: La legalización del aborto permite reducir la mortalidad materna.

Mito 1: La muerte por aborto es un prioridad de salud pública

El aborto representa el 0,2% de las defunciones femeninas en edad fértil, ocupando el puesto 58 en el ranking de causas.

En 2018 se registraron 19 muertes maternas debidas a “aborto médico, otro aborto, aborto no especificado e intento fallido de aborto” que son el 7% de las 257 defunciones totales.

Tasa por aborto en general ha disminuido en 62% (5 c/100.000 NV) y es de las más bajas del mundo.


Mito 2: Hay un gran número de hospitalizaciones por abortos clandestinos

Los egresos hospitalarios por todo tipo de abortos son el 10% del total de hospitalizaciones por maternidad, y vienen disminuyendo (-43%).

Mito 3: La legalización del aborto permite reducir la mortalidad materna.

- Estudios internacionales confirman que la mortalidad materna disminuye trabajando en educación, acceso a la salud calificada, mejoras en las condiciones de vida e información para el control de la fertilidad.
- La legalización del aborto no tiene efecto causal.


La mortalidad materna disminuyó un 61%, y la mortalidad materna por aborto disminuyó más del 90% desde que se derogó la ley de aborto en Chile



Fuentes: Elaboración Propia con datos oficiales del Ministerio de Salud de Chile

Koch E (2014) Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología . Chile SOCHOG 2014; 79(5): 351 – 360. Editorial. Epidemiología del aborto y su prevención en Chile.

Uruguay bajo la mortalidad materna y la mortalidad materna por aborto antes de la ley de aborto




Octubre 2012
Ley de Aborto Legal

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del Ministerio de Salud de Uruguay.

La mortalidad materna disminuye trabajando en educación, acceso a la salud calificada, mejoras en las condiciones de vida e información. La legalización del aborto no tiene efecto causal.

Factores que reducen la Mortalidad y Morbilidad Materna – Evidencia científica 181 países



Fuentes: (1) Maternal mortality for 181 countries, 1980–2008: a systematic analysis of progress towards Millennium Development Goal 5. Margaret C Hogan, Kyle J Foreman, Mohsen Naghavi, Stephanie Y Ahn, Mengru Wang, Susanna M Makela, Alan D Lopez, Rafael Lozano, Christopher J L Murray www.thelancet.com Vol 375 May 8, 2010. Página 1619-1622 (2) Koch E, Chireau M, Pliego F, Stanford J, Haddad S, Calhoun B, Aracena P, Bravo M, Gatica S, Thorp J. Abortion legislation, maternal healthcare, fertility, female literacy, sanitation, violence against women and maternal deaths: a natural experiment in 32 Mexican states. *BMJ Open*. 2015 Feb 23;5(2):e006013

Resumen: Las estadísticas oficiales dan luz sobre los mitos del aborto

Mito 1: La muerte por aborto es un prioridad de salud pública

- Las estadísticas muestran que el aborto representa el 0,2% de las defunciones femeninas en edad fértil, ocupando el puesto 58 en el ranking de causas, y el puesto 72 del total de defunciones femeninas.
- El aborto representa el 7% de las 257 defunciones maternas del 2018.
- La tasa de mortalidad materna por aborto en general ha disminuido significativamente y actualmente es de las más bajas del mundo.

Mito 2: Hay un gran número de hospitalizaciones por abortos clandestinos

- Las estadísticas oficiales confirman que los egresos hospitalarios por aborto incluyen todo tipo de abortos, son el 10% del total de hospitalizaciones por maternidad, y vienen disminuyendo. Un gran porcentaje de ellas son por aborto espontáneo.

Mito 3: La legalización del aborto permite reducir la mortalidad materna

- Estudios internacionales confirman que la legalización del aborto no tiene efecto causal en la disminución de la mortalidad materna, y que la mortalidad materna disminuye trabajando en el aumento de la educación de la mujer, en el acceso a la salud calificada para la embarazada, en mejoras en las condiciones de vida y sanitarias, y en la información para la prevención y control de la propia fertilidad.
- Los datos oficiales de Argentina, Uruguay y Chile, indican que es posible disminuir la mortalidad materna y la mortalidad por aborto, sin la legalización.